

Informatiebrief na een wortelkanaalbehandeling



Napijn

Na een wortelkanaalbehandeling kan enige napijn optreden. Het is normaal dat u nog zo'n 2 tot 3 dagen enige last ondervindt. De napijn is met een gewone pijnstiller (paracetamol) goed te onderdrukken.

Koorts en/of zwelling

Indien er sprake is van een ontsteking aan de wortelpunt, dan is er een (kleine) kans aanwezig dat deze ontsteking na een wortelkanaalbehandeling gaat opvlammen. Indien u koorts heeft en/of er sprake is van een zwelling na de behandeling, dan is het raadzaam dat u contact opneemt met de praktijk.

Controle van de behandeling

Een jaar na een wortelkanaalbehandeling wordt de behandeling vaak gecontroleerd. Dan wordt er tijdens de halfjaarlijkse controle een röntgenfoto gemaakt van de tand of kies. Zo kan het herstel van het kaakbot gecontroleerd worden.

Vervolgbehandeling

Na een wortelkanaalbehandeling kan de tand of kies verzwakt zijn. Vaak is de tand of kies al groot gevuld. Om goed te kunnen blijven functioneren, kan een kroon nodig zijn. Een tand of kies die op deze wijze is behandeld, kan zo duurzaam worden hersteld.

Vragen?

Mocht u klachten of vragen hebben, dan kunt u altijd bellen.

Tandartsenpraktijk Burgum is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 uur - 12.00 uur en van 13.30 uur - 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 uur - 12.00 uur. Telefoonnummer: 0511-464308.